

殺虫剤

マイキラ

メタアルデヒド水和剤(フロアブル)



サンケイ化学株式会社

®はサンケイ化学(株)の登録商標

成分 メタアルデヒド…30.0%
水、界面活性剤等

速効的に効く!



マイキラ

農林水産省登録 第16688号
有効成分:メタアルデヒド 30.0%
性状:白色水和性粘稠懸濁液体
毒性:劇物
有効年限:3年
包装:500ml瓶×20



- ナメクジ類、カタツムリ類に高い防除効果があります!
- 接触により速効的に作用します!
- ナメクジ類、カタツムリ類の種類に関係なく有効です!

【効果の認められているナメクジ類・カタツムリ類】

みかん栽培で



梅雨時期の被害防止に!

ナメクジ類

- アシヒダナメクジ
- コウラナメクジ
- フタスジナメクジ
- チャコウラナメクジ
- ノハラナメクジ

カタツムリ類

- ウスカワマイマイ
- アフリカマイマイ
- オカモノアラガイ
- オオクビキレガイ

キャベツ

レタス栽培で



葉間への侵入、徘徊痕や被害の防止に!

適用病害虫名および使用方法

平成26年11月19日現在の登録内容

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	メタアルデヒドを含む 農薬の総使用回数
かんぎつ	—	ナメクジ類 カタツムリ類	200倍	200~700L	収穫30日前まで	3回以内	散布	6回以内 (散布は3回以内)
キャベツ				100~300L	収穫14日前まで			
レタス			200~500倍					

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	メタアルデヒドを含む 農薬の総使用回数
花き類 観葉植物	花き類・観葉 植物栽培温室 等の生息地	ナメクジ類 カタツムリ類	100~200倍	100~300L	—	6回以内	散布	6回以内
ナメクジ類、 カタツムリ類が 加害する 農作物等	ほ場周辺 雑草地の 生息地						作物にかから ないように 土壌表面 処理する	

▲ 使用上の注意事項

- 使用前によく振ってから使用してください。
- ほ場周辺雑草地の生息地を対象として使用する場合、ほ場周辺の雑草地に散布し、作物に直接散布しないよう又、ドリフトに注意して使用してください。
- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とししてください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。使用後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼をしてください。
- 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

上手な使い方

- 使用前に容器を反転させ、よく振ってからご使用下さい。
- ナメクジ・カタツムリは夜間活動しますので、夕方に散布することをおすすめします。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所に置かないでください。

NIK-MK2014.11S

取扱い



サンケイ化学株式会社

東京本社
深谷営業所
大阪営業所

〒110-0005 東京都台東区上野 7-6-11

〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1丁目 13-1

〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4丁目 5-1

☎(03) 3845-7951

☎(048) 551-2122

☎(06) 6305-5871