

狙ったところを美しく!

スナップショットTM 粒剤

■有効成分：イソキサベン…0.5%
トリフルラリン…2.0%

農林水産省登録
第22127号

■人畜毒性：普通物

■有効期限：5年

■包装単位：1.2kg×10袋

スナップショットは花木、樹木、地被植物の植栽地、芝地での雑草種子の発芽・成長を阻害します。

特長

21種類の樹木に安心して使える

いろいろな樹木が根裁されていてもOK

イネ科も広葉も、撒いたところは、そのままきれいに雑草が生えない

抑草効果が長く持続

抑草期間の目安：

15~20kg/10アール=約6ヶ月

6~8kg/10アール=約4ヶ月

適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り 使用量 (kg)	本剤の 使用回数	使用方法	イソキサベンを含む 農薬の総使用回数	トリフルラリンを含む 農薬の総使用回数
樹木類	一年生雑草	植付後 (雑草発生前)	6~8	2回以内	土壌表面散布	2回以内	2回以内
		植付活着後 (秋期雑草発生前)	15~20				
日本芝		秋期雑草発生前	6~8		全面土壌散布		

※本資料は平成21年1月現在の知見に基づき作成されています。

効果のある雑草

イネ科から広葉まで、当年に種子から発生してくる幅広い雑草に効果があります。

春に発生

メヒシバ、エノコログサ、ノビエなど

シロザ、スベリヒユ、イヌビノ、イヌタデ、
コニシキソウ、エノキグサ、ヤハズソウ、ト
キンソウなど

秋冬に発生

スズメノカタビラ、スズメノテッポウなど

セイヨウタンポポ、ヒメジョオン、ハルジオン、ハ
コベ、ノミノフスマ、ナズナ、イヌガシラ、ハルタ
デ、ホトケノザ、オオイヌノフグリなど

散布方法とそのポイント

粒剤ですので、すぐ散布できます。植栽木がすでに活着している場合には1㎡当り15~20グラムを、植付け直後では6~8グラムを薬剤使用量として均一に撒いてください。

ポイント
1

すでに生えている雑草には効果がないため、散布前にきれいに
取り除いてください。また、落ち葉や刈枝なども均一散布のため
に、散布前にきれいに取り除いてください。

ポイント
2

散布時に、土壌が乾燥していると効果が十分に発揮できない場
合があります。土壌に適度な湿り気のある状態で使用してくださ
い。

効果・薬害等の注意

1. さし木、床替え床では薬害のおそれがあるので使用しないでください。
2. 処理時に発生している雑草には効果がないので、中耕除草などにより取り除いてから処理してください。
3. 対象作物の茎葉が濡れている時には薬害のおそれがあるので処理しないでください。
4. 周辺に草花などがある場合はかからないように注意して処理してください。
5. 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意

1. 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
 2. 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合は、直ちに石けんでよく洗い落としてください。
 3. 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗顔・うがいをするとともに衣服を交換してください。
 4. 作業時に着用した衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
 5. かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 魚毒性……水産動物に影響を及ぼすので養殖池などの周辺では使用しないでください。
- 保管……密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所に保管してください。

●使用前にラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●空袋等は圃場などに放置せず、環境に影響をあたえないよう適切に処理してください。

販売



全国農薬協同組合

東京都千代田区内神田3-3-4 〒101-0047
TEL(03)3254-4171(代) FAX(03)3256-0980
http://www.znouyaku.or.jp

取扱

製造 ダウ・ケミカル日本株式会社 ダウ・アグロサイエンス事業部門
URL http://www.dowagro.com/jp

SNP.12.10.10UW