

殺そ剤

サンケイ **クマリン**

野ネズミ ギヤツン!

- 有効成分：ワルファリン…0.1%
- 毒性：普通物
- 性状：淡赤褐色粒状
- 包装：500g × 30袋



製造
琉球産経株式会社

沖縄県豊見城市字高安586
〒901-0242 ☎(098) 850-7791(代)



全国農薬協同組合

〒101-0047 東京都千代田区内神田3-3-4
(全農薬ビル)
TEL 03-3254-4171(代) FAX 03-3256-0980
<http://www.znouyaku.or.jp>

《特長》

- ネズミの好む穀物等をバランス良く配合し粒剤化していますので、ネズミの食いつきが一段とよくなっています。
- 包装の小袋は、特殊加工紙を使用していますので、雨や露の影響をうけにくく、長い間効果を発揮します。

《適用害獣と使用方法》

作物名	適用場所	適用害獣名	10アール当り 使用量	使用方法
野そが加害する農作物等	農地・山林	野そ	300～600 g	本剤10～20 gを紙に包むか、又は給餌器に入れ、ねずみの出没する場所に配置する。なくなったら補充して、4～5日間連続投与する。

《使用上の注意事項》

- 野そが人間の体臭をきらう場合があるので作業中は手袋などをして、直接毒餌が手（皮ふ）にふれないようにする。
- 犬、ネコ、牛、馬、ニワトリなど家畜・家禽類**に毒餌を食われるおそれのある場所での使用はさける。特に家禽は本剤に弱いので十分注意する。
- 効果をあげるため毒餌施用後、喫食箇所に対し、4～5日間必ず補充し連続配置する。
- 誤食などないように小児の手の届かない所に置き、余った毒餌などは回収する。
- 作業後は顔、手足など皮ふの露出部を石けんでよく洗うこと。
- 配置箇所については堆積物、障害物、樹木の根際その他の出没しやすい場所に配置すると有効である。

《保管》

- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。又、食品、飼料などとは厳重に区別する。
- ラベルをよく読んで、記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 空袋は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。