

農林水産省登録 第24101号



殺虫剤



マイキラー[®]

メタアルデヒド水和剤

®はサンケイ化学(株)の登録商標



ナメクジ
カタツムリに
よく効く!



サンケイ化学株式会社

製品情報はこちらから



マイキラール[®]L

速効的に効く!

農林水産省登録 第24101号

有効成分：メタアルデヒド 10.0%
 性状：白色水和性粘稠懸濁液体
 毒性：普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指している通称)
 有効年限：3年
 包装：500ml×20

殺虫剤分類

特長

- ナメクジ類、カタツムリ類に高い防除効果があります!
- 接触により速効的に作用します!
- 多くの種類のナメクジ、カタツムリに有効です!
- 普通物の製剤です!

効果の認められている ナメクジ類・カタツムリ類

ナメクジ類



- アシヒダナメクジ
- コウラナメクジ
- フタスジナメクジ
- チャコウラナメクジ
- ノハラナメクジ

カタツムリ類



- ウスカワマイマイ
- アフリカマイマイ
- オカモノアラガイ
- オオクビキレガイ



みかん栽培で

梅雨時期の
被害防止に!



キャベツ・レタス栽培で

葉間への侵入、徘徊痕や被害の防止に!



上手な使い方

使用前に容器を反転
させ、よく振ってから
ご使用下さい。

ナメクジ・カタツムリは
夜間活動しますので、
夕方に散布することを
おすすめします。

適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	メタアルデヒドを含む 農業の総使用回数
かんきつ	ナメクジ類 カタツムリ類	200倍	200～700L	収穫30日前まで	3回以内	散布	6回以内 (散布及び株元散布は 合計3回以内)
キャベツ レタス		400倍	100～300L	収穫14日前まで			6回以内 (散布及び株元散布は 合計3回以内 (但し、株元散布は 2回以内))
非結球レタス							6回以内 (散布は3回以内)
花き類・観葉植物		—	6回以内				

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	10a当り使用液量	本剤の使用回数	使用方法	メタアルデヒドを含む 農業の総使用回数
ナメクジ類、 カタツムリ類が 加害する 農作物等	ほ場周辺 雑草地の 生息地	ナメクジ類 カタツムリ類	200～400倍	100～300L	6回以内	作物にかからないように 土壌表面に散布する	6回以内

▲ 使用上の注意事項

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめ使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめ(勧め)します。
- 誤飲などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合に

は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。

- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他の物とは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
- 夏期高温時の使用をさけてください。
- 直射日光が当たらない低温な場所に密栓して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所に置かないでください。

NIK>MIKL202409S

取扱い



サンケイ化学株式会社

東京本社 〒110-0005 東京都台東区上野7-6-11 ☎(03) 3845-7951
 東京営業部 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1丁目13-1 ☎(048) 551-2122
 大阪営業部 〒532-0011 大阪市淀川区西中島2丁目14-6 ☎(06) 6305-5871