

いろいろな樹木に使えます。



### 推奨 21 樹種

アベリア、いぬつけ、  
かいづかいぶき、  
かなめもち、くちなみし、  
このてがしづわ、  
さざんか、さつき、  
しゃりんばい、  
じんちょうげ、つけ、  
つつじ、つばき、  
どうだんつつじ、  
とべら、なんてん、  
におひば、  
はいびゅくしん、  
ひいらぎなんてん、  
ピラカンサ、  
ゆきやなぎ

\* 上記の 21 推奨樹種以外にはじめて使用する場合には、事前にその樹種への安全性を確認してから使用するようお願いします。

**スナップショットは、  
雑草の発芽前に散布すれば、  
長期間きれいに  
雑草管理できます。**



**樹冠下、植栽地でも  
使えます**



**植え込み用  
雑草を生やさなくする！**

広範囲の一年生イネ科雑草及び広葉雑草について、  
長期にわたり発生を抑えます。

### 除草剤

**スナップショット<sup>TM</sup>粒剤**

イソキサベン・トリフルラリン粒剤

® TM: ザ・ダウ・ケミカル・カンパニーまたはその関連会社商標

狙ったところを美しく!

# スナップショット<sup>TM</sup>粒剤

■有効成分：イソキサベン…0.5%  
トリフルラリン…2.0%  
■有効期限：5年  
■包装単位：1.2kg×10袋

農林水産省登録  
第22127号

スナップショットは花木、樹木、地被植物の植栽地、芝地での雑草種子の発芽・成長を阻害します。

## 特長

21種類の樹木に安心して使える

いろいろな樹木が混栽されていてもOK

イネ科も広葉も、撒いたところは、そのままきれいに雑草が生えない

## 抑草効果が長く持続

抑草期間の目安：

15~20kg/10アール=約6ヶ月

6~8kg/10アール=約4ヶ月

## 適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量(kg)	本剤の使用回数	使用方法	適用場所	イソキサベンを含む農薬の総使用回数	トリフルラリンを含む農薬の総使用回数
樹木類		植付後 (雑草発生前)	6~8	2回以内	土壤表面散布	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等	2回以内	2回以内
		植付活着後 (秋期雑草発生前)	15~20					
日本芝	一年生雑草	秋期芝生育期 (雑草発生前)	6~8		全面土壌散布		2回以内	
樹木等		雑草発生前	6~15		植栽地を除く 樹木等の周辺 地に全面土壌 散布		3回以内	

※本資料は2015年11月現在の知見に基づき作成されています。

## 効果のある雑草

イネ科から広葉まで、当年に種子から発生してくる幅広い雑草に効果があります。

### 春に発生

メヒシバ、エノコログサ、ノビエなど

シロザ、スペリヒュ、イヌビヌ、イヌタデ、コニシキソウ、エノキグサ、ヤハズソウ、トキンソウなど

### 秋冬に発生

スズメノカタビラ、スズメノテッポウなど

セイヨウタンポポ、ヒメジョオン、ハルジオン、ハコベ、ノミノフスマ、ナズナ、イヌガシラ、ハルタデ、ホトケノザ、オオイヌノフグリなど

## 散布方法とそのポイント

粒剤ですので、すぐ散布できます。植栽木がすでに活着している場合には1m<sup>2</sup>当り15~20グラムを、植付け直後では6~8グラムを薬剤使用量として均一に撒いてください。

### ポイント1

すでに生えている雑草には効果がないため、散布前にきれいに取り除いてください。また、落ち葉や刈枝なども均一散布のために、散布前にきれいに取り除いてください。

### ポイント2

散布時に、土壤が乾燥していると効果が十分に発揮できない場合があります。土壤に適度な湿り気のある状態で使用してください。

## △ 安全使用上の注意

- 1.本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 2.本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合は、直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 3.散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗顔・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 4.作業時に着用した衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- 5.かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 6.公園等で使用する場合は、散布中および散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域内に立ち入らないよう縄張いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 7.使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。
- 魚毒性……水産動物に影響を及ぼすので養殖池などの周辺では使用しないでください。
- 保管……密封し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼・乾燥した所に保管してください。

- 使用前にラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。  
●空袋等は圃場などに放置せず、環境に影響をあたえないよう適切に処理してください。

販売



全国農業協同組合

東京都千代田区内神田3-3-4 TEL 03-3254-4171 FAX 03-3256-0980  
<http://www.znouyaku.or.jp>

取扱